



10 ข้อควรระวัง เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า

1 โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย



2 โรคพิษสุนัขบ้า สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วย เช่น แมว ชะนี ลิง กระรอก กระแต หนู ค้างคาว หรือแม้กระทั่ง วัว ควาย ม้า สุนัข

3 สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุด กว่า 95% ของผู้เสียชีวิตมาจากสุนัข

4 สุนัขและแมว ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำลาย



5 คากา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า **อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง**

6 หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบ ล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสะอาด และสบู่ หลาย ๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

7 ควรรับวัคซีนตามกำหนดเวลา อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเฝ้าระวัง สุนัขหรือแมวที่มากัดเป็นเวลา 10 วัน หากสัตว์ตายระหว่างดูอาการ ให้แจ้ง ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตัดหัวสุนัข ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



8 อาการสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ระยะเริ่มแรก เช่น สุนัขจะมีอารมณ์ และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ม่านตา ขยายกว้างกว่าปกติ กินข้าวกินน้ำ น้อยลง การเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติ



9 ต้องพาสุนัขหรือแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

10 ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ตามลำพัง ต้องใส่สายจูงเมื่อพาสุนัข ออกนอกบ้าน ถ้าสุนัขดูควรสวมเครื่อง ป้องกันสุนัขกัด

